# Kiese und Sande im nördlichen Oberrheingraben

**Verbreitungsgebiete:** Nördlicher Oberrheingraben und Region Mannheim

**Erdgeschichtliche Einstufung:** Quartär, Mannheim-Formation und Obere Viernheim-Formation (Neuzenlache-Subformation)

(Hinweis: Die Rohstoffkartierung liegt noch nicht landesweit vor. Der Bearbeitungsstand der Kartierung lässt sich in der Karte über das Symbol "Themenebenen" links oben einblenden.)


LUDWIGSHAFEN
am Rhein
MANNHEIM
HEIDELBERG
Neckar
Frankenthal
(Pfalz)
Lampert-
heim
Viernheim
Heppenheim
(Bergstr.)
Weinheim
Kaiserslautern
Neustadt
a.d.Weinstr.
Speyer
Landau
in der Pfalz
Leimen
Wiesloch
Sinsheim
HEILBRONN
Neckarsulm
Bruchsal
Bretten
KARLSRUHE
Rastatt
Germersheim
Bad Bergzabern
Wissembourg
Rodalben
Edenkoben
Römerberg
Philippsburg
Graben-Neudorf
Östringen
Bad Schönborn
Kraichtal
Eppingen
Schwaigern
Brackenhein
Sulzfeld
Zeberfeld
Bönnigheim
Ilsfeld
Besigheim
Bietigheim-
Mühlacker
Maulbronn
Königsbach-Stein
Rheinstetten
Walzbachtal
Jockgrim-Leopoldshafen
Kandel
Wörth
am Rhein
Bellheim
Rülzheim
Lingenfeld
Schifferstadt
Hockenheim
Walldorf
Sandhausen
Schwetzingen
Eppelheim
Brühl
Altrip
Limburgerhof
Mutterstadt
Wachenheim
Deidesheim
Bad Dürkheim
Grünstadt
Eisenberg
(Pfalz)
Lambrecht
(Pfalz)
Annweiler
am Trifels
Landstuhl
Trippstadt
Otterberg
Alsenborn
Enkenbach-
Kusel
Pirmasens
Zweibrücken
Saarbrücken
Mosbach
Buchen
(Odenwald)
Adelsheim
Möckmühl
Billigheim
Neudenau
Neuenstadt
am Kocher
Bad Wimpfen
Bad
Friedrichshall
Weinsberg
Brackenheim
Lauffen
a.N.
Talheim
Abstatt
Unter-
gruppenbach
Oberstenf
Großbottwar
Steinheim
Eberbach
Neckargemünd
Bammental
Waldbrunn
Limbach
Schefflenz
Elztal
Mudau
Beerfelden
Wald-
Michelbach
Mörlenbach
Hemsbach
Bobenhm.-Roxhm.
Gölheim
Donnersberg
Rockenhausen
Winnweiler
Hettenleidelheim
Carlsberg
Otterbach
Weiler-
bach
Rodenbach
Höchstyer
Wachenheim
a.d. Weinstr.
Deidesheim
Lambrecht
(Pfalz)
Trippstadt
Waldfischbach-Burgalben
Rodalben
Hauenstein
Dahn
Lemberg
Herxheim
bei Landau/Pfalz
Eggenstein-
Leopoldshafen
Stutensee
Weingarten
(Baden)
Graben-
Neudorf
Ubstadt-Weiher
Kirchardt
Schwaigern
Lein-
garten
Ober-
derdingen
Illingen
Maulbronn
Mühlhsn-
hausen
Angelbach-
tal
Gondelsheim
Helmstadt-Bargen
Gundels-
heim
Bad Rappenau
Waib-
stadt
Übrigheim
Neckar-
steinach
Neckargemünd
Aglasterhsn.
Schriesheim
Edingen-Neckarhausen
Katzenbuckel
Seckach
Höpfingen
Wald
Buchen
(Odenwald)
Mudau
Beerfelden
Wald-
Michelbach
Görxheimertal



*Gewaschene Kieskörnung*

## Gestein

Die Kiese werden überwiegend aus verwitterungsresistenten **Geröllen** aus dem Alpenraum aufgebaut, gefolgt von Geröllen aus dem Odenwald und dem Schwarzwald-Vogesen-Gebiet. Typische **„Leitgerölle“** für den Rhein sind unter anderem rote und schwarze **Lydite bzw. Kieselschiefer** alpiner Herkunft, honiggelbe **Quarzite** und viele **Flyschkalke**. Die Schichtenfolge besteht überwiegend aus mittel- bis grobsandigen Fein- bis Mittelkieslagen, untergeordnet auch aus Grobkiesen, und fein- bis mittelkiesigen Mittel- bis Grobsanden. Außerdem kommen auch reine Sandlagen vor.

# Petrographie

**Korngrößenverteilung** für die Kiese und Sande des Rheins:

| Korngröße | Mittelwert [%] |
|---|---|
| Schluff (< 0,063 mm) | 1,3 |
| Sand (0,063–< 2 mm) | 59,9 |
| Fein- bis Mittelkies (2–< 16 mm) | 29,4 |
| Grobkies (16–< 63 mm) | 9,5 |
| Überkorn (> = 63 mm) | 0,5 |

**Geröllpetrographische Zusammensetzung** der Fraktion 16/32 mm:

| Petrographie | Mittelwert [%] |
|---|---|
| Lydite, Hornsteine | 3,5 |
| Quarze, Milchquarze und Quarzbrekzien | 18,1 |
| Quarzite | 26,5 |
| Gneise und Granite | 7,8 |
| Amphibolite | 0,6 |
| Porphyr | 4,4 |
| Kalksteine | 13,4 |
| Kalksandsteine | 8,9 |
| kalkfreie Sandsteine | 11,4 |
| Buntsandstein | 2,9 |
| Alpine Metamorphite | 0,7 |
| Grauwacke | 0,7 |
| Sonstige | 1,3 |

Die **Sande** bestehen überwiegend aus Quarz und Feldspat, gefolgt von Calcit.
Der Karbonatgehalt der Sandfraktion 0/2 mm beträgt im Mittel 5,7 %.

# Mächtigkeit

**Geologische Mächtigkeit**: Die geologische Mächtigkeit der Mannheim-Formation (Oberes Kieslager) erreicht maximal **45 m**. Die Nutzbarkeit der Oberen Viernheim-Kiessande (Mittleres Kieslager) liegt bei maximal **55 m**.

**Genutzte Mächtigkeit**: Aufgrund der meist feinkörnigen Ausbildung der Ludwigshafen-Formation (Oberer Zwischenhorizont) und seiner stark variierenden Tiefenlage sowie weiterer mächtiger Zwischenhorizonte liegt die mittlere nutzbare Mächtigkeit der Mannheim-Formation (Oberes Kieslager) bei **20–30 m**, entlang des Rheins teilweise auch darunter.

© Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 9 LGRB — Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau



*Gewaschener Sand*

## Gewinnung und Verwendung

**Gewinnung:** Entlang des Rheins südlich von Mannheim befanden sich mehrere Baggerseen, die letzte Rheinkiesförderung wurde Ende August 2011 eingestellt. Die **Nassauskiesung** erfolgte mit einem Schwimmbagger oder von einem Baggerschiff aus.

**Verwendung:** Der größte Anteil der Rheinkiese ging in die **Betonherstellung**, meist Fertigbeton.

## Externe Lexika

LITHOLEX

- Mannheim-Formation
- Ludwigshafen-Formation
- Viernheim-Formation

## Literatur


- LGRB (2012a). *Blatt L 6516 Mannheim, L 6518 Heidelberg-Nord und L 6716 Speyer, mit Erläuterungen.* – Karte der mineralischen Rohstoffe von Baden-Württemberg 1 : 50 000, 167 S., 32 Abb., 7 Tab., 1 Kt., Freiburg i. Br. (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau). [Bearbeiter: Kleinschnitz, M., m. Beitr. v. Werner, W.]


Datenschutz

Cookie-Einstellungen

Barrierefreiheit

---

**Quell-URL (zuletzt geändert am 20.02.26 - 08:40):**https://lgrbwissen.stage.lgrb-bw.de/rohstoffgeologie/rohstoffe-des-landes/kiese-sandig/kiese-sande-im-noerdlichen-oberrheingraben